

AGROSTIM FORTE



Pomocný přípravek se silným stimulačním účinkem určený k probírce násady plodů u jableň. Při pravidelném používání snižuje alternaci plodnosti u jaderovin.

Účinné látky

kyselina α -naftyloctová 6,5 g/l
nativní aminokyseliny

Balení

10 l HDPE kanistr

Výhody použití

- výborně snižuje násadu plodů u jableň
- podporuje tvorbu vyrovnanějších plodů s lepšími kvalitativními parametry
- při pravidelném používání významně omezuje vyčerpávání stromů v důsledku střídavé plodnosti
- přítomnost aminokyselin podporuje růst a lepší vývoj jablek nejvyšší kvality

Působení přípravku

Kyselina alfa-naftyl octová patří do skupiny auxinů, které jsou přirozenými hormony v rostlinách. Ovlivňuje metabolismus rostlin a buněčné dělení. Podle termínu aplikace tato látka stimuluje opad nadbytečných plodů. Aminokyseliny, které jsou součástí formulace, zlepšují adhesivní vlastnosti a významně omezují skapávání přípravku z povrchu plodů a listů, podporují růst a vývoj jablek nejvyšší kvality.

Redukce násady plodů

Agrostim Forte se aplikuje v době, kdy největší plody v růžici mají průměr 10–12 (14) mm (u odrůd Reneta 8–12 mm), tj. cca 10–15 dní po odkvětu. Nejlepší účinek se dosáhne při postřiku za teplého počasí (min. 16 °C) a při vysoké vzdušné vlhkosti (nad 80 %). Proto je nejlépe aplikovat přípravek brzy ráno nebo navečer, případně za podmračeného počasí, aby postřik pomalu osychal. Aplikaci je nezbytné provádět formou jemného postřiku, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení plodů a postřiková kapalina okapávala. V žádném případě nepoužívat za příliš chladného nebo teplého počasí. Ošetřovat jen zdravé stromy v plné plodnosti, které bohatě opylení. Někdy se na listech může projevit lehký fyto toxický účinek, který ale odezní bez vlivu na výnos.

Dávkování přípravku

4 l/ha Agrostim Forte pro odrůdy: Grávštýnské, Rosen, Jonagold, Jonathan, Kids Orange, Red Delicius, Spartan, Starkling, Starkrimson, Stayman Red, Summered.

5 l/ha Agrostim Forte pro odrůdy: Boskopské, Cox Orange, Elstar, Gala, Golden Delicius, Idared, Mai-gold, Primerouge, Parména zlatá.

Použití smáčedla, doporučení

Do postřikové tekutiny je možné přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v dávce 0,3 l/ha (0,03 %), zejména v období bohatém na dešťové srážky. Před vlastním používáním přípravku se doporučuje udělat pokusné aplikace za účelem upřesnění dávky podle odrůd a hlavně podle místních klimatických podmínek.

Snížení násady plodů

Holovousy 2005

Neošetřeno



Agrostim Forte 5,0 l/ha



Návod k použití, dávkování

Dávka vody 800–1500 l/ha

Plodina	Účel použití	Dávka/1000 l vody koncentrace	OL	Poznámka
Jabloň	Probírka plodů	4–5 l (0,4–0,5 %)	AT	-
	Probírka plodů	4–5 l + 0,3 l	AT	TM Agrovital

OL = ochranná lhůta (dny)