

Flowbrix s Solfernusem V/O

Balíček na 8–10 ha.

Nová fungicidní kombinace pro ošetření révy proti padlí a peronospoře, jabloní proti houbovým chorobám.

Účinné látky

oxychlorid Cu 660 g/l
síra 800 g/l

Balení

20 l PE-HD kanistr Flowbrix
20 l HDPE kanistr Solfernus V/O

Výhody použití

- výhodná cena ošetření při společném nákupu
- kombinovaný účinek
- působí kontaktně a preventivně
- moderní tekuté formulace s anti-rezistentním účinkem

Působení přípravků

Flowbrix působí kontaktně a preventivně. Mechanismus účinku je založen na schopnosti mědi inhibovat klíčení spor patogena na povrchu všech ošetřených částí. V révině se přípravek používá v opakovaných aplikacích vždy preventivně. Kromě peronospory přípravek

vykazuje vedlejší účinnost na černou spálu, černou skvnitost a černou hnilobu révy. Příznivě působí na vyžrávaní rostlinných pletiv čímž dochází ke zvýšení odolnosti ošetřovaných rostlin k poškození chorobami, škůdci a povětrnostními vlivy. Flowbrix je mimořádně vhodný pro opakované aplikace nízkých dávek mědi v pozdějším období po odkvětu révy.

V jadrovinách se přípravek aplikuje po řezu na počátku rašení proti korovým nekrotám (nektriová rakovina, cytosporové odumírání jabloně), toto ošetření účinkuje

zároveň proti rané strupovitosti. Aplikace Flowbrixu 1–2 dny před výskytem ranního mrazíku v dávce 0,05–0,07% zvyšuje mrazuvzdornost květů. U jabloní a hrušní se ošetření provádí na počátku květu, dokvétání a na počátku růstu plodů.

Solfernus V působí kontaktně a preventivně proti houbám ze skupiny padlí, dále *Taphrina* spp., *Glomerella* spp., *Mycosphaerella* spp. *Coccomyces* spp. Vykazuje významný akaricidní účinek proti hálčivcům rodů *Aceria*, *Epitrimerus*, *Eriophyes*, proti roztočkovitým z rodů *Tarsonemus* a *Hemitarsonemus*, také proti svluškám z čeledi *Tetranychidae*.

Solfernus O se v jadrovinách používá před květem nebo po odkvětu 1–4× opakovat až do fáze zabarvení plodů.

Vysoká účinnost přípravků proti padlí je zajištěna optimální velikostí elementární síry spolu s vysoce efektivními smáčedly a dispergenty v tekuté formulaci.

Dávkování přípravků



2–3,5 l/ha Flowbrix
+ 5 l/ha Solfernus O
(500 l/ha vody)

0,7 l/ha (0,07%) Flowbrix
+ 10 l/ha Solfernus O
(1000 l/ha vody)



Proti smyvu deštěm používejte v kombinaci s Agrovitalem v dávce 0,25–0,5 l/ha (0,5 l Agrovitalu do 1000 litrů vody).

Na podporu, prodloužení účinnosti a zvýšení ochrany kontaktní složky ve směsi proti smyvu deštěm používejte v kombinaci s Agrovitalem v dávce 0,25–0,5 l/ha (0,5 l Agrovitalu do 1000 l vody).

Návod k použití, dávkování

Plodina	Podmínky pro rozvoj chorob, účel použití	Růstová fáze	Dávka přípravků
Réva vinná	Pro použití při menším ohrožení porostu perenosporou a padlím	do počátku kvetení (do BBCH 61)	1,25 l/ha Flowbrix + 2 l/ha Solfernus V - max. 500 l/ha vody - postřikový interval 7–10 dnů - balíček na cca 10 ha
	Pro použití při vysokém ohrožení porostu perenosporou a padlím	od počátku kvetení (od BBCH 61)	2–2,5 l/ha Flowbrix + 2–4 l/ha Solfernus V - max. 1000 l/ha vody - postřikový interval 7–10 dnů - balíček na 8 ha
Jádroviny	Korové nekrózy, raná strupovitost, padlí (nedostatek síry)	Na počátku rašení	2 l/ha Flowbrix + 2 l/ha Solfernus O max. 500 l/ha vody balíček na cca 10 ha
Jabloň, hrušeň	Bakteriální spála růžovitých, ochrana proti mrazu, padlí (nedostatek síry)	Na počátku květu a při dokvétání	0,7 l/ha Flowbrix + 2 l/ha Solfernus O max. 1000 l/ha vody balíček na cca 10 ha

Dávkování přípravků (postřikový interval 7–10 dní)

