

Koban Top s Laudisem

**Balíček na 10 ha.
Herbicidní kombinace pro postemergentní
ošetření kukuřice.**

Účinné látky

pethoxamid 300 g/l
terbuthylazine 187,5 g/l
tembotrione 44 g/l
isoxadifen-ethyl 22 g/l (safener)

Balení

20 l HDPE/PA kanystr Koban Top
4 x 5 l HDPE kanystr Laudis

Výhody použití

- výhodná cena ošetření při společném nákupu
- plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy
- účinek přes půdu i přes listy plevelů
- široké aplikační okno nazávisle na růstové fázi plevelů i kukuřice

Působení přípravků

Koban Top je herbicidní přípravek určený k základnímu ošetření kukuřice a vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu porostu kukuřice. Přípravek je možné aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy zpravidla ve fázi 2–6 listů kukuřice a v době, kdy dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 5 listů, ježatka kuří noha je hubena do fáze 1–2 listů.

Laudis dosahuje nejlepší účinnosti při aplikaci na mladé aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst plevelů. Trávnaté plevele jsou nejcitlivější od 1 do 5 listů před začátkem odnožování, ježatka kuří noha je hubena do fáze 2 odnoží. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–6 listů, merlíky, laskavce a rdesna jsou hubeny i ve vyšších růstových stádiích.

Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina	Plevele	Růstová fáze plevelů	Dávka přípravků
Kukuřice	Ježatka kuří noha	1 list–začátek odnožování	2,0–2,5 l/ha Koban Top + 1,5–1,7 l/ha Laudis Časnější aplikace
	Merlíky, laskavce, rdesna, výdrol řepky a ostatní dvouděložné plevele	2–8 listů	
	Ježatka kuří noha	Začátek odnožování–2 odnož	1,5–2,0 l/ha Koban Top + 2,0 l/ha Laudis Pozdnější aplikace
	Prosa, béry, rosička	1–5 listů	
	Oves hluchý, výdrol obilnin	2–3 listy	
	Merlíky laskavce, rdesna	2 listy až 25 cm výška	
	Pcháč oset a ostatní dvouděložné plevele	Do výšky 15–20 cm	



Koban Top 2 l/ha + Laudis 2 l/ha - účinnost pozdní postemergentní aplikace

Použití herbicidů v kukuřici vzhledem k růstové fázi plevelů

Koban Top + Laudis

Dávka 2–2,5 l/ha + 1,5–1,7 l/ha - časně postemergentní aplikace



Ježatka 1. list–začátek odnožování, dvouděložné plevely 2–8 listů, výdrol slunečnice, výdrol řepky, durman, pcháč

Koban Top + Laudis

Dávka 1,5–2 l/ha + 2 l/ha - pozdně postemergentní aplikace



Ježatka začátek odnožování–2 odnože, prosa, béry, rosička 1–5 listů, oves hluchý a výdrol obilovin 2–3 listy, dvouděložné plevely 2–8 listů, výdrol řepky, výdrol slunečnice, rdesna, durman, pcháč