

STAMPA



Kontaktní organický fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro před sklízňové ošetření jabloní a hrušní proti skládkovým chorobám.

Účinná látka

fludioxonil 500 g/kg

Balení

1 kg plastový pytel

Výhody použití

- širokospektrální účinnost proti všem významným původcům skládkových chorob
- krátká ochranná lhůta
- brání klíčení konidií cílových patogenů na povrchu plodů
- nízké toxikologické riziko a vynikající ekotoxikologický profil

Působení přípravku

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je účinná látka odvozená z pyrrrolnitrinu, přírodní antimykotické látky produkované půdními bakteriemi rodu *Pseudomonas* spp.. Mechanismu účinnosti je založen na omezení klíčení konidií cílových patogenů. Přípravek účinkuje kontaktně a preventivně k omezení výskytu původců skládkových chorob jako jsou *Penicillium* spp., *Alternaria* spp., *Rhizopus* spp., *Botrytis* spp., *Nectria* spp. a *Colletotrichum gloeosporioides*. Aplikace se provádí bezprostředně před sklízňou nebo v raných fázích infekce tak, aby se zabránilo rozpadu ovoce během skladování.

Pokyny pro aplikaci

Přípravek používejte preventivně od fáze BBCH 74 (průměr plodů do 40 mm) do fáze BBCH 89 (zralost) ošetřením plodů před jejich sklízňou. První ošetření se doporučuje provádět na začátku zrání plodů, tj.

cca 14 dnů před plánovanou sklízňou. V případě nutnosti se druhé ošetření provádí cca 7 dnů před plánovanou sklízňou tak, aby se zabránilo napadení plodů před jejich naskladněním. Pro omezení praskání plodů, zvýšení pevnosti plodů, zlepšení vybarvení, hojení drobných poranění a zlepšení pokrývnosti postřiku se v praxi osvědčila společná aplikace Stampa 0,4 kg/ha + Lecid 0,4 l/ha.

Mísitelnost a lepší kompatibilita

Přípravek lze mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin, s výjimkou insekticidů s extrémně kyselým pH. Přípravek je také mísitelný s přípravky Agrostim Nitrofenol, Agrostim TRIA a Lecid. Nelze mísit s fungicidy na bázi síry a mědi. Před každou aplikací je potřeba zkontrolovat kompatibilitu. V případě zhoršené mísitelnosti jednotlivých přípravků přidáním SPRAY AIDE do tohoto TM zajistíte bezproblémovou kompatibilitu postřikové směsi.



Stampa přináší novou úroveň ochrany plodů proti skládkovým chorobám

Návod k použití, dávkování

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka/ha	Dávka vody/ha	OL	Poznámka
Jabloň, hrušeň	Skládkové choroby	0,4 kg + 0,4 l Lecid	200–1000 l	3	BBCH 74–89, max. 2× za rok, aplikační interval min. 7 dnů

OL - ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní



Napadení plodů lze předejít včasnou aplikací fungicidu Stampa