

Aspect Pro s Laudisem

**Balíček na 13 ha.
Osvědčená herbicidní kombinace
pro postemergentní ošetření kukuřice.**

Účinné látky

flufenacet 200 g/l
terbuthylazine 333 g/l
tembotrione 44 g/l
isoxadifen-ethyl 22 g/l (safener)

Balení

4 × 5 l COEX kanystř Aspect Pro
4 × 5 l HDPE kanystř Laudis

Výhody použití

- výhodná cena ošetření při společném nákupu
- vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici
- účinek přes půdu i přes listy plevelů
- plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy
- široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice
- herbicidní kombinace vysoce tolerantní ke kukuřici i při vyšších vývojových stádiích

Působení přípravků

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu ošetření kukuřice a vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu porostu kukuřice. Přípravek je možné aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy zpravidla ve fázi 2–6 listů kukuřice a v době, kdy dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 5 listů, ježatka kuří noha je hubena do fáze 1–2 listů. Laudis dosahuje nejlepší účinnosti při aplikaci na mladé aktivně rostoucí plevele za podmínek pří-

znivých pro růst plevelů. Trávnité plevele jsou nejcitlivější od 1 do 5 listů před začátkem odnožování, ježatka kuří noha je hubena do fáze 2 odnoží. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–6 listů, merlíky, laskavce a rdesna jsou hubeny i ve vyšších růstových stádiích.

Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina	Plevele	Růstová fáze plevelů	Dávka přípravků/ha
Kukuřice	Ježatka kuří noha	1 list–začátek odnožování	1,5 l Aspect Pro + 1,5 l Laudis Časnější aplikace
	Merlíky, laskavce, rdesna, výdrol řepky a ostatní dvouděložné plevele	2–8 listů	
	Ježatka kuří noha	Začátek odnožování–2 odnože	1,5 l Aspect Pro + 2,0 l Laudis Pozdnější aplikace
	Prosa, béry, rosička	1–5 listů	
	Oves hluchý, výdrol obilnin	2–3 listy	
	Merlíky, laskavce, rdesna	2 listy až 25 cm výška	
	Pcháč oset a ostatní dvouděložné plevele	Do výšky 15–20 cm	



Aspect Pro 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha - optimální načasování aplikace, plevelé začínají zarůstat prostor mezi řádky kukuřice

Použití herbicidů v kukuřici vzhledem k růstové fázi plevelů

Aspect Pro + Laudis

Dávka 1,5 l/ha + 1,5 l/ha - časně postemergentní aplikace



Ježatka 1. list–začátek odnožování, dvouděložné plevelé 2–8 listů, výdrol slunečnice, výdrol řepky, durman, pcháč

Aspect Pro + Laudis

Dávka 1,5 l/ha + 2 l/ha - pozdně postemergentní aplikace



Ježatka začátek odnožování–2 odnože, prosa, béry, rosička 1–5 listů, oves hluchý a výdrol obilnin 2–3 listy, dvouděložné plevelé 2–8 listů, výdrol řepky, výdrol slunečnice, rdesna, durman, pcháč