



# AZOLINE SC s Prosarem

**Balíček na 10 ha pro komplexní fungicidní ošetření pšenice, tritikale, žita a řepky proti všem hospodářsky významným houbovým chorobám.**

## Účinné látky

azoxystrobin 250 g/l  
prothioconazole 125 g/l  
tebuconazole 125 g/l

## Balení

1 × 5 l HDPE kanystr Azoline SC  
1 × 5 l HDPE kanystr Prosaro 250 EC

## Výhody použití

- originální kombinace strobilurinu a dvou triazolů
- široké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám pšenice, ječmene, řepky a kukuřice
- dlouhodobé protektivní, kurativní i eradikativní působení
- výhodná cena ošetření při společném nákupu

## Působení přípravku

Azoline SC obsahuje účinnou látku azoxystrobin, která patří do chemické skupiny  $\beta$  - methoxyakrylátů (strobiluriny). Má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů v dýchacím řetězci. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti většině hospodářsky významným houbovým chorobám pšenice, tritikale, žita a řepky olejky. Prosaro 250 EC je dvousložkový systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností proti mimořádně širokému spektru houbových chorob v celé řadě plodin. Obě účinné

látky přípravku patří do skupiny triazolových fungicidů a působí jako inhibitory biosyntézy ergosterolu. Do rostlin je přípravek velmi rychle absorbován a následně je akropetálně transportován do celého profilu listu. Dostává se tedy i do míst, která nebyla postřikem přímo zasažena. Přípravek se používá ve větší míře hlavních plodin jako jsou obilniny, řepka olejka, kukuřice a další.

## Upozornění

Při aplikaci v plodinách s hůře smáčitelnými listy (řepka) nebo pokud se očekává déšť do 3 hodin, nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikací kapalin na povrchu rostlin nebo hrozí-li nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07% (0,2 l/ha v 300 l/ha vody).



Azoline SC s Prosarem má široké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám řepky, pšenice, tritikále a žita

### Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina	Škodlivý organismus	Růstová fáze plodiny	OL	Dávka přípravků/ha
Pšenice ozimá, pšenice jarní, tritikale ozimé, žito ozimé	Padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, helmintosporióza pšenice, rez pšeničná	BBCH 31–59	35	0,5 l Azoline SC + 0,5 l Prosaro 250 EC Balíček na 10 ha
	Fuzariózy v klase	BBCH 61–65	35	
Řepka olejka ozimá	Hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáiová skvrnitost brukvovitých	BBCH 61–69	65	0,5 l Azoline SC + 0,5 l Prosaro 250 EC Balíček na 10 ha

OL = ochranná lhůta (dny) AT je dána technologickým termínem ošetření.

### Fungicidní ošetření proti listovým a klasovým chorobám

