



AZOLINE SC s Prothioconazolem 250

Balíček na 10 ha pro komplexní fungicidní ošetření pšenice, tritikale, žita, ječmene a řepky proti všem hospodářsky významným houbovým chorobám.

Účinné látky

azoxystrobin 250 g/l
prothioconazole 250 g/l

Balení

1 × 5 l HDPE kanystr Azoline SC
1 × 5 l HDPE kanystr Prothioconazole 250

Výhody použití

- originální kombinace strobilurinu a triazolu
- široké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám pšenice, ječmene a řepky
- dlouhodobé protektivní, kurativní i eradikativní působení
- výhodná cena ošetření při společném nákupu

Působení přípravku

Azoline SC obsahuje účinnou látku azoxystrobin, která patří do chemické skupiny β - methoxyakrylátů (strobiluriny). Má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů v dýchacím řetězci. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti většině hospodářsky významným houbovým chorobám pšenice, tritikale, žita a řepky olejky. Prothioconazole 250 je systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností proti mimořádně širokému spektru houbových chorob v celé řadě plodin. Účinná látka přípravku patří

do skupiny triazolových fungicidů a působí jako inhibitory biosyntézy ergosterolu. Do rostlin je přípravek velmi rychle absorbován a následně je akropetálně transportován do celého profilu listu. Dostává se tedy i do míst, která nebyla postřikem přímo zasažena. Přípravek se používá ve většině hlavních plodin jako jsou obilniny a řepka.

Upozornění

Při aplikaci v plodinách s hůře smálčitelnými listy (řepka) nebo pokud se očekává dešť do 3 hodin, nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin nebo hrozí-li nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07% (0,2 l/ha v 300 l/ha vody).



Azoline SC s Prothioconazole 250 má široké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám řepky, pšenice, ječmene, tritikále a žito

Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina	Škodlivý organismus	Růstová fáze plodiny	OL	Dávka přípravků/ha
Pšenice ozimá, pšenice jarní, tritikale ozimé, žito	Padlí travní, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, helmintosporiíza pšenice, rez pšeničná	BBCH 31–59	35	0,5 l Azoline SC + 0,5 l Prothioconazole 250 Balíček na 10 ha
	Fuzariózy v klase	BBCH 61–65	35	
ječmen jarní	Hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, rez ječná	BBCH 31–59	35	0,5 l Azoline SC + 0,5 l Prothioconazole 250 Balíček na 10 ha
Řepka olejka	Hlízenka obecná, plíseň šedá, alternariová skvrnitost brukvovitých	BBCH 61–69	65	0,5 l Azoline SC + 0,5 l Prothioconazole 250 Balíček na 10 ha

OL = ochranná lhůta (dny)

AT je dána technologickým termínem ošetření.

Azoline SC je základní stavební kámen kvalitního fungicidního ošetření

